

Plan d'aménagement du ravage de cerfs de Virginie situé sur la forêt d'enseignement et de recherche de Macpès

RAVAGE DUCHÉNIER – COMPARTIMENT A

EXERCICE 2025-2030

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Remerciements

Kimberley Bérubé-Boyle, ingénierie forestière, Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
Diane Chénard, technicienne forestière, Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
Manon Perreault, biologiste, Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
Jessica Phaneuf, technicienne de la faune, Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent
Élise Roussel-Garneau, biologiste, Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent
Patrick St-Laurent, technicien forestier, Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la gestion des forêts
du Bas-Saint-Laurent
335, rue Moreault
Rimouski (Québec) G5L 9C8
Téléphone : 418 727-3710
bas-saint-laurent.foret@mrfn.gouv.qc.ca

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Direction de la gestion de la faune
du Bas-Saint-Laurent
335, rue Moreault
Rimouski (Québec) G5L 9C8
Téléphone : 418 727-3710
bas-saint-laurent.faune@mffp.gouv.qc.ca

Signature

Le Plan d'aménagement du ravage de cerfs de Virginie Duchénier, compartiment A, situé sur la forêt d'enseignement et de recherche (FER) de Macpès, a été réalisé sous ma responsabilité.

Kimberley Bérubé- Signature numérique de
Boyle Kimberley Bérubé-Boyle
Date : 2025.09.25 11:22:24 -04'00'

2025-09-25

Kimberley Boyle-Bérubé, ing.f.
Responsable régionale de la planification forestière
Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent

Date

Diffusion

La présente publication est accessible en ligne seulement.

Photographie de la couverture

Pierre Bernier

© Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025
ISBN 978-2-555-02121-1 (PDF)

Avant-propos

Les plans d'aménagement des aires de confinement du cerf de Virginie situées sur les terres publiques du Bas-Saint-Laurent ont été révisés. Une entente administrative entre la Direction de la gestion des forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) confie aux directeurs régionaux la réalisation des plans d'aménagement pour les ravages de cerfs de Virginie de plus de 5 km² situés sur les terres du domaine de l'État. Les plans ont donc été rédigés conjointement par ces deux directions.


Le présent plan d'aménagement s'applique au compartiment A du ravage Duchénier, dans sa portion située dans la FER de Macpès, pour la période 2025-2030. Il a été élaboré conformément à la dernière version du *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* publié en 2013 par le ministère des Ressources naturelles et le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (Hébert et coll., 2013).

Responsabilité administrative

Approbation du plan d'aménagement :



Luc Gagnon, directeur
Direction de la gestion des forêts du
Bas-Saint-Laurent
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts



Hugo Canuel, directeur
Direction de la gestion de la faune du
Bas-Saint-Laurent
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Date : 22 septembre 2025

Date : 19 septembre 2025

Résumé

Une portion de l'aire de confinement du cerf de Virginie, ou ravage, est située dans les limites de la FER de Macpès. Le ravage Duchénier occupe 23 % de la superficie de ce territoire, soit 526 ha.

Le ravage Duchénier a déjà été le deuxième ravage en importance dans la région avec une occupation de 162 km² à l'hiver 1998. Pourtant, depuis quelques années, la population a fortement diminué. En 2018, le ravage Duchénier a atteint son aire d'occupation la plus basse, soit 23 km². L'aménagement le plus raffiné possible est donc nécessaire dans ce ravage pour assurer la pérennité de l'espèce dans la région.

Les objectifs d'aménagement pour ce ravage visent, entre autres, à augmenter les peuplements de nourriture-abri, à assurer l'entremêlement des peuplements d'abri et de nourriture ainsi qu'à maintenir la proportion actuelle d'abris.

Les superficies¹ d'intervention de récolte à planifier pour 2025-2030 sont celles présentées ci-dessous.

Intervention	Ravage Duchénier Compartiment A
Coupe partielle	12 ha
Coupe de régénération	3 ha
Total	15 ha

¹ P. MARCOTTE (2015), *Résultats finaux de l'analyse des possibilités forestières, période 2015-2020*, FER de Macpès, modifications à la section sur l'aire de confinement du cerf de Virginie, 9 p.

Table des matières

1. Mise en contexte.....	1
2. Tenure et gestion territoriale	2
3. Description de l'habitat	4
3.1 Potentiel d'utilisation des strates forestières par le cerf de Virginie	4
3.2 Occupation hivernale des aires fixes d'aménagement de ravages par le cerf de Virginie.....	5
3.3 Superficies forestières aménageables	7
4. Objectifs d'aménagement et stratégies de mise en œuvre.....	8
4.1 Objectifs d'aménagement	8
4.2 Stratégie d'aménagement selon le type de forêts regroupées.....	9
4.2.1 Les sapinières	9
4.2.2 Les cédrières.....	10
4.2.3 Les pessières.....	10
4.2.4 Les feuillus tolérants.....	10
4.2.5 Les feuillus tolérants à résineux	11
4.2.6 Les bétulaires blanches, les bétulaires blanches à résineux, les peupleraies, les peupleraies à résineux et les érablières rouges	11
5. Plan d'intervention 2025-2030.....	13
5.1 Superficie et localisation des secteurs d'intervention.....	13
5.2 Modalités particulières d'intervention	15
5.2.1 Protection des essences longévives et des essences contribuant au maintien de la biodiversité	15
5.2.2 Lisières boisées riveraines	15
5.2.3 Voirie forestière	16
5.2.4 Récolte dans les peuplements dominés par les peupliers	16
5.2.5 Coupe de régénération.....	17
5.2.6 Coupe partielle	18
5.2.7 Éclaircie précommerciale et nettoiement.....	18
5.2.8 Dégagement mécanique de la régénération.....	18
5.2.9 Regarni	19
5.2.10 Plantation	19
6. Conclusion	20
7. Références	21

Liste des tableaux

Tableau 1 Subdivision territoriale du ravage Duchénier	2
Tableau 2 Classification des peuplements forestiers selon leur potentiel d'utilisation par les cerfs	4
Tableau 3 Superficies forestières aménageables, compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès	7
Tableau 4 Répartition de la superficie forestière aménageable selon les types de couverts forestiers, compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès	7
Tableau 5 Superficie des interventions de récolte à effectuer pour la période 2025-2030 dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès	13

Liste des figures

Figure 1 Localisation du ravage de cerfs de Virginie.....	3
Figure 2 Intensité de l'occupation des cerfs de Virginie pendant l'hiver 2023	6
Figure 3 Localisation des secteurs d'intervention planifiés dans le ravage.....	14
Figure 4 Grille décisionnelle de récolte propre aux ravages situés dans les peuplements dominés par les peupliers	16

1. Mise en contexte

Au Bas-Saint-Laurent, la rigueur des hivers constitue un facteur très limitant pour le cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*). La disponibilité d'un habitat d'hiver de qualité est donc un élément essentiel pouvant jouer un rôle capital dans le maintien ainsi que dans la mise en valeur de cette espèce. L'aménagement de l'habitat hivernal du cerf de Virginie représente donc une occasion pour intégrer des objectifs fauniques et forestiers aux interventions planifiées dans ces habitats particuliers.

La démarche générale vise toutefois le long terme, par la programmation et la dispersion d'interventions fines dans les aires de confinement du cerf de Virginie, nommées *ravages* dans le présent document. Dans la région, on compte 30 habitats du cerf de Virginie dont la tenure est mixte ou en totalité publique. Des plans d'aménagement de l'habitat, utilisant une approche multicritère favorisant à la fois la production d'habitats et la production forestière, ont été préparés pour l'ensemble des superficies localisées sur le territoire public.

Les interventions effectuées dans les ravages reconnus comme habitat faunique doivent être réalisées conformément aux lois et aux règlements en vigueur au Québec : la *Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier*, la *Loi sur la qualité de l'environnement*, la *Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune* de même que le *Règlement sur les habitats fauniques* et le *Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État*. L'exécution des travaux doit aussi être conforme aux exigences décrites dans les prescriptions sylvicoles. De plus, bien que certaines appellations de traitements puissent être les mêmes que celles décrites dans le *Guide sylvicole du Québec*, les prescriptions de travaux présentées dans ce document peuvent différer et être associées à des modalités particulières (section 5.2). C'est le cas notamment de l'éclaircie précommerciale (EPC) et du nettoiement, qui font l'objet de mesures d'atténuation pour la faune (MFFP, 2015).

Le présent plan d'aménagement s'applique au compartiment A du ravage Duchénier, dans la portion située à l'intérieur des limites de la FER de Macpès, et ce, pour la période 2025-2030. Il précède et encadre l'exécution des travaux sylvicoles et il sera incorporé à titre de modification dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de la FER de Macpès pour cette période. Les principes qui sont décrits ultérieurement s'appuient sur la plus récente version du *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* (Hébert et coll., 2013).

2. Tenure et gestion territoriale

Le ravage Duchénier est situé en tenue mixte (privée et publique) et il occupe en tout 11 412 ha (voir la figure 1). En vue de faciliter la gestion de ce grand territoire, quatre compartiments ont été délimités (A, B, C et D). Le compartiment A correspond à la section du ravage située sur le territoire forestier résiduel (TFR) sous convention de gestion territoriale (CGT) avec la municipalité régionale de comté (MRC) de Rimouski-Neigette et sur la FER de Macpès (voir le tableau 1). Ce ravage se trouve à proximité de plusieurs villages et ses limites recoupent des entités territoriales dont la gestion des ressources est confiée à différents organismes. Ce potentiel diversifié augmente d'autant plus la pertinence de bien évaluer la portée des effets directs et indirects de chacune des activités réalisées sur ce territoire.


La FER de Macpès occupe une superficie de 2 169 ha et sa gestion forestière est confiée au Cégep de Rimouski depuis 1989. **Le présent document porte sur la portion du compartiment A du ravage Duchénier (526 ha) qui est située dans les limites du territoire de la FER de Macpès².**

Tableau 1 Subdivision territoriale du ravage Duchénier

Tenure et gestion territoriale	Superficie	
	(ha)	(%)
Unité d'aménagement 012-72	6 707	59
Territoire sous convention de gestion	850	7
Aires protégées (refuge biologique et écosystème forestier exceptionnel)	2 468	22
Forêt d'enseignement et de recherche de Macpès	526	5
Total partiel du territoire public	10 551	92
Territoire privé	861	7
Total	11 412	100

² La source des données numériques utilisées pour calculer les superficies inscrites dans les tableaux du plan d'aménagement pour l'exercice 2025-2030 est la suivante : J:\BD_GEOM\Source\CENTRALES\SOR\Foret.gdb\DDDE_STF_20K_FER_VUE_S, (2025-04-09).

**Figure 1 - Localisation du ravage de cerfs de Virginie
FER de Macpès**



Aire de confinement du cerf de Virginie

Habitat faunique du cerf de Virginie
Forêt d'enseignement et de recherche

Unité d'aménagement

Limite d'unité de gestion forestière

Tenure

Publique

Privée

Hydrographie

Cours d'eau

Plan d'eau

Organisation administrative

• Ville, localité
Municipalité régionale de comté (MRC)
Région administrative
Convention de gestion territoriale

Infrastructure de transport

Autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire
Chemin de fer

Projection cartographique

NAD 1983 MTM 6

0 0,75 1,5 2,25 km

1/80 000

Source

Base de données régionale du MRNF

2025

Bas-Saint-Laurent (BDGEO)

Production

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent

Note : Le présent document n'a aucune portée légale.

© Gouvernement du Québec, 2025

3. Description de l'habitat

3.1 POTENTIEL D'UTILISATION DES STRATES FORESTIÈRES PAR LE CERF DE VIRGINIE

Le *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* (Hébert et coll., 2013) répartit en quatre classes les peuplements forestiers, qu'ils soient aménageables ou non, selon leur potentiel actuel d'abri et de nourriture pour le cerf. Ces deux composantes sont évaluées à partir des données écoforestières telles que le type de couvert, la composition (groupement d'essences), la densité, la hauteur et l'âge des peuplements forestiers. Le même guide fixe une cible régionale (seuil minimal) à atteindre ou à maintenir pour les classes *abri* et *nourriture-abri*. Ces cibles doivent être atteintes et les seuils, respectés dans chaque aire de confinement ou ravage. Dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune qui caractérise notre région, **les cibles à atteindre sont de 35 % pour la classe *abri* et de 25 % pour la classe *nourriture-abri*, alors que les seuils minimaux à maintenir sont fixés à 50 % de chacune d'elles.**

Dans le but d'actualiser la caractérisation du potentiel d'utilisation de l'habitat par le cerf dans ce ravage, les peuplements ont été analysés à l'aide d'un modèle de qualité de l'habitat (MQH, extension Faune-MQH-Cer de 2023, version 2.1.6) et en fonction de la dernière mise à jour des données écoforestières disponibles (2023). La DGFa-01 a conçu un outil afin d'identifier la proportion d'abris en devenir dans la composante nourriture-abri du MQH (voir le script R en annexe 1). Les peuplements d'abri en devenir fournissent davantage d'abris que de nourriture. Ils sont donc inclus dans le calcul de la cible d'abri. Cette façon de faire permet d'avoir une idée de la quantité d'abris dans le prochain plan et d'aménager les peuplements en conséquence. Le tableau 2 montre le résultat de la classification du potentiel d'utilisation obtenu dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès.

Dans ce compartiment, la proportion de peuplements offrant un potentiel d'abri atteint l'objectif régional. Toutefois, la proportion de nourriture-abris est quant à elle loin en dessous de l'objectif régional fixé et le seuil minimal établi n'est pas atteint.

Tableau 2 Classification des peuplements forestiers selon leur potentiel d'utilisation par les cerfs

Ravage		Abri	Abri en devenir	Nourriture-abri	Nourriture	Peu utilisé	Total
Duchénier Compartiment A (FER de Macpès)	(%) (ha)	34 188	2 10	6 33	19 104	39 211	100 546

3.2 OCCUPATION HIVERNALE DES AIRES FIXES D'AMÉNAGEMENT DE RAVAGES PAR LE CERF DE VIRGINIE


Le système de suivi des populations de cerfs de Virginie s'appuie sur le recensement de plusieurs paramètres réalisé annuellement ou sur des périodes quinquennales. L'inventaire aérien, qui permet de réviser la cartographie des aires d'occupation du cerf de Virginie dans les habitats, est l'un des moyens utilisés pour mesurer les fluctuations totales de population. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, des cotes de densité dans le réseau de pistes ont été ajoutées à la méthode d'inventaire, de manière à raffiner l'information obtenue. Le but est de disposer de données supplémentaires nécessaires à l'analyse et à la programmation de travaux d'aménagement de l'habitat. Lors du survol, les observateurs caractérisent le réseau de pistes selon trois catégories :

- 1) Présence d'une ou de quelques pistes ou d'un sentier sans ramifications;
- 2) Présence de plusieurs sentiers avec quelques ramifications secondaires et pistes;
- 3) Présence d'un réseau de sentiers avec plusieurs ramifications et présence d'une forte intensité de pistes.

Étant donné l'importance de l'aire de confinement de Duchénier, on y réalise un suivi plus soutenu que dans d'autres habitats. Ainsi, depuis l'hiver rigoureux de 2008 durant lequel l'indice prévisionnel NIVA (mesure du niveau d'enfoncement du cerf dans la neige) a atteint un plafond record de 10 301 jours/cm d'enfoncement à la station de neige Duchénier, six survols aériens y ont été réalisés. D'un point de vue historique, il est admis que la rigueur des hivers dans cette portion de la région est supérieure de 43 % à ce que l'on observe à la station de neige Ashbérish, dans le ravage Lac-Témiscouata, soit une moyenne de 1 576 jours/cm supplémentaires. Les portions de territoire fréquentées par les cerfs ont subi des changements au cours des dernières années. De 2009 à 2012, le territoire de la FER de Macpès était fréquenté à 61 %, tandis que, lors des inventaires de 2014 et 2018, la fréquentation n'était plus que de 16 %. En 2023, la fréquentation a diminué, pour ne représenter que 2 %. Toutefois, on remarque, sur l'ensemble du ravage Duchénier, une hausse de l'occupation depuis l'inventaire de 2018 (Roussel-Garneau et Phaneuf, 2023).

La figure 2 illustre la densité des réseaux de pistes recensés pendant l'hiver 2023 dans le ravage Duchénier. On constate depuis plusieurs années un important déplacement de l'occupation du territoire par le cerf vers le nord-est. Le phénomène serait en partie associé au nourrissage artificiel par les résidents et les villégiateurs du secteur. Les inventaires aériens révèlent une forte augmentation du nombre de petits ravages, qui est passé de 30 en 2009 à 119 en 2023. Bien que la superficie totale de cette catégorie soit à la hausse entre 2018 et 2023, elle décrit un état de fragmentation dans les réseaux et un affaiblissement de la densité d'animaux dans le ravage. Malgré tout, la superficie globale occupée demeure stable depuis 2018. Dans l'ensemble, les pertes de réseaux y sont plus importantes que dans certains ravages localisés plus à l'ouest pour la même période. Les hivers moins cléments dans cette portion de la région peuvent expliquer les pertes de densité plus importantes qui y ont été répertoriées, comparativement aux ravages localisés à l'ouest du territoire.

Figure 2 - Intensité de l'occupation des cerfs de Virginie pendant l'hiver 2023 Ravage Duchénier



Aire de confinement du cerf de Virginie

Intensité de l'occupation

Fair

 Moyenne

Forte

Forêt d'enseignement et de recherche

Organisation administrative

— Municipalité régionale de comté (MRC)
— Région administrative

Convention de gestion territoriale

Infrastructure de transport

Réseau secondaire
Chemin de fer

Hydrographie

Projection cartographique
NAD 1983 MTM 6

Source: Base de données régionale du MRNF
Roc Saint-Léonard (RDCEOM)

Bas-Saint-Laurent (BDSQ) |
Production
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
Note : Le présent document n'a aucune portée légale.
© Gouvernement du Québec, 2025

3.3 SUPERFICIES FORESTIÈRES AMÉNAGEABLES

La superficie du ravage se divise en trois catégories : la superficie forestière, les plans d'eau et les autres sites non forestiers. La superficie forestière représente donc l'habitat forestier du cerf de Virginie. La superficie dite aménageable est la superficie forestière dont on a soustrait des portions de territoire sur lesquelles des activités d'aménagement forestier ne sont pas permises; ce sont par exemple les refuges biologiques, les écosystèmes forestiers exceptionnels, les forêts d'expérimentation, les portions inaccessibles en raison de la topographie et les infrastructures touristiques. Le tableau 3 présente les superficies forestières du compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès ainsi que la proportion qui est aménageable. La superficie forestière aménageable a été calculée et utilisée par le Bureau du forestier en chef pour déterminer la possibilité forestière dans les limites du ravage pour la période 2025-2030.

Tableau 3 Superficies forestières aménageables, compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès

Superficie forestière	Superficie forestière aménageable	
(ha)	(ha)	(%)
493	475	96

Le tableau 4 montre la répartition de la superficie forestière aménageable selon les différents types de forêts regroupées. Cette répartition de la forêt précise le profil de la composition actuelle et permet aussi d'évaluer le potentiel d'abri à plus long terme pour chaque ravage. Dans ce tableau, les peuplements sont répartis selon trois grands types de couverts forestiers : résineux, mixtes et feuillus. La superficie occupée par le groupe résineux et le groupe mixte est semblable. L'alternance de forêts résineuses et mixtes représente un bon potentiel d'habitat pour le cerf. Cependant, la densité relativement élevée de peupliers dans la forêt mixte de ce territoire peut nuire à l'atteinte de la cible régionale d'abri, puisque ce type de forêt est sujet à l'enfeuillage après coupe.

Tableau 4 Répartition de la superficie forestière aménageable selon les types de couverts forestiers, compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès

	Résineux	Mixtes	Feuillus	Total
(ha)	168	135	190	493
(%)	34	27	39	100

4. Objectifs d'aménagement et stratégies de mise en œuvre

Comme mentionné précédemment, les principes d'aménagement utilisés dans ce plan s'appuient sur la plus récente version du *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* (Hébert et coll., 2013). Les orientations et les objectifs utilisés tendent à répondre à des problèmes précis visant à la fois le maintien, l'amélioration et la restauration de l'habitat du cerf. Ce plan a été incorporé à titre de modification dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel du territoire de la FER de Macpès, pour la période 2025-2030. Les différentes prescriptions sylvicoles issues des plans d'aménagement de ravages précédent et encadrent l'exécution des travaux sylvicoles qui peut différer des façons de faire usuelles.

4.1 OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT

À long terme et à l'échelle du territoire visé par l'aménagement, on doit maximiser l'entremêlement des peuplements forestiers dans le but d'accroître l'effet de bordure entre l'abri et la nourriture. La situation d'abri et de nourriture-abri actuelle (voir le tableau 2) de ce ravage a été comparée aux cibles régionales. Le potentiel d'habitat, soit la proportion occupée par les différents types de couverts forestiers, a également été évalué en vue de l'atteinte des cibles à plus long terme (voir le tableau 4). L'analyse de ces paramètres a permis de déterminer la situation de cet habitat et de fixer des objectifs d'aménagement ainsi que des priorités d'intervention répondant aux problèmes soulevés. Ces objectifs d'aménagement doivent guider la planification des travaux dans chaque ravage ou compartiment de ravage. De plus, nous nous référerons à l'essentiel des stratégies de la mise en œuvre présentées dans le *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* (Hébert et coll., 2013). Les lignes suivantes présentent les différents problèmes et les objectifs fixés dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès, pour la période 2025-2030.

La situation de cet habitat montre que la proportion actuelle d'abris (36 %) atteint la cible régionale établie et que la proportion de nourriture-abris (6 %) est bien en dessous du seuil minimal établi pour la région. De plus, une proportion importante des peuplements du compartiment A est dominée par les feuillus intolérants.

Voici les **objectifs** quinquennaux poursuivis selon cette situation :

- Viser le maintien de la proportion d'abris établie pour la région;
- Favoriser la répartition spatiale (l'entremêlement) des composantes abri et nourriture;
- Augmenter le potentiel de nourriture-abri à moyen terme;
- Convertir des peuplements peu utilisés en habitat intéressant pour le cerf.

4.2 STRATÉGIE D'AMÉNAGEMENT SELON LE TYPE DE FORÊTS REGROUPÉES

Les aires de confinement constituent des habitats essentiels pour le maintien des populations de cerfs de Virginie de la région. L'aménagement des ravages doit être orienté en fonction du potentiel d'habitat actuel et futur des peuplements qui les composent, et ce, en vue d'atteindre les objectifs fixés pour améliorer ou maintenir l'habitat du cerf.

La forêt est constituée d'un très grand nombre de peuplements forestiers. Pour en faciliter la gestion en ce qui a trait au calcul des possibilités forestières sur un territoire, on doit les regrouper pour former des entités qui possèdent une certaine similitude. On observe cette similitude dans leur composition, leur dynamique forestière, les défis sylvicoles qu'ils représentent et les traitements sylvicoles compatibles avec leur dynamique naturelle. Ces regroupements se nomment *types de forêts regroupées*. Les sous-sections suivantes décrivent les types de forêts regroupées dans le cadre de la stratégie d'aménagement à mettre en œuvre dans ces peuplements, en fonction de la qualité de l'habitat du ravage.

4.2.1 Les sapinières

Le type de forêts regroupées des sapinières comprend les sapinières à épinette, les sapinières à thuya et les sapinières pures. Ce regroupement possède une dynamique naturelle complexe, influencée par les épidémies d'insectes (surtout par la tordeuse des bourgeons de l'épinette [TBE]) et par le vent. En matière d'habitat, ces peuplements représentent un potentiel d'abri, de nourriture-abri et de nourriture. Ils sont décrits comme des peuplements de haute valeur pour le cerf.

Leur potentiel de nourriture varie beaucoup en fonction de la qualité du site. Dans les stations écologiques les plus riches, les composantes abri et nourriture peuvent se trouver dans un même peuplement. Lorsque ces peuplements sont situés sur un site de qualité et qu'ils comportent une proportion suffisante d'essences longévives (épinette, thuya et pin), ils peuvent être aménagés en vue d'établir une structure inéquienne ou étagée au moyen de coupes partielles (CP) appropriées, de façon à favoriser le maintien de leur potentiel d'abri et de nourriture.

Dans les sites plus pauvres, la structure équienne sera favorisée. La contiguïté des composantes abri et nourriture sera alors obtenue par l'étalement des coupes de régénération (CR) dans le temps et sur l'ensemble du territoire. Ce type de récolte doit s'appliquer prioritairement dans les peuplements dégradés et régénérés. Les traitements d'éducation des jeunes peuplements doivent favoriser la composition mixte à dominance résineuse ou l'hétérogénéité des essences résineuses. Lorsque le reboisement est nécessaire, le regarni est à privilégier, avec l'épinette blanche ou le thuya, selon le site. **La plantation doit être une mesure de dernier recours.** En plus de maintenir un couvert résineux, les interventions dans ce regroupement de peuplements doivent favoriser l'augmentation de la proportion d'espèces longévives.

4.2.2 Les cédrères

Le type de forêts regroupées des cédrères comprend les cédrères pures, les cédrères à feuillus, les cédrères à résineux, les cédrères à sapin et les cédrères à épinette. Ce regroupement possède une dynamique naturelle complexe, influencée par le feu, le vent et la sénescence naturelle.

Les cédrères offrent un potentiel d'abri, de nourriture-abri et de nourriture aux cerfs. Le thuya est une essence à favoriser dans l'habitat hivernal du cerf en raison de sa grande longévité et de sa résistance aux insectes et aux maladies. Le *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie* (Hébert et coll., 2013) recommande d'exclure les thuyas de toute récolte dans les ravages. **Tous les peuplements situés dans le compartiment A du ravage Duchénier de la FER de Macpès et dominés par le thuya ont été soustraits de l'aménagement forestier.**

4.2.3 Les pessières

Le type de forêts regroupées des pessières comprend les pessières à sapin, les pessières à thuya, les pessières blanches, les pessières noires et les pessières rouges. Ce regroupement possède une dynamique naturelle complexe, influencée par le feu, les épidémies d'insectes (surtout par la TBE) et le vent.

En matière d'habitat, les pessières noires sont peu occupées par le cerf. Le potentiel de nourriture y est très faible, la régénération de sapins constituant souvent la seule nourriture disponible pour les cervidés. Cependant, la longévité de l'épinette noire est un élément d'intérêt pour maintenir le potentiel d'abri dans certains ravages. En contrepartie, les pessières blanches représentent un potentiel d'abri, de nourriture-abri et de nourriture. Elles sont décrites comme des peuplements de haute valeur pour le cerf.

Ces peuplements peuvent être aménagés en vue d'établir une structure inéquienne ou étagée au moyen de CP appropriées, de façon à favoriser le maintien de leur potentiel d'abri. Afin d'éviter le risque d'ensapinage, il est nécessaire de travailler sur la gestion de la composition végétale pour augmenter ou maintenir la proportion d'essences résineuses longévives (épinette, thuya et pin). Lorsque les peuplements sont dégradés et régénérés, des CR peuvent être pertinentes. La coupe avec protection des petites tiges marchandes doit être favorisée en vue de conserver la structure étagée. L'étalement des CR dans les peuplements dominés par l'épinette noire vise essentiellement la répartition de l'abri. Le reboisement est rarement nécessaire dans ces forêts; le regarni est à privilégier, avec l'épinette blanche ou le thuya, selon le site, pour augmenter la diversité.

4.2.4 Les feuillus tolérants

Le type de forêts regroupées des feuillus tolérants comprend les bétulaies jaunes à feuillus intolérants, les bétulaies jaunes à feuillus tolérants, les érablières à sucre, les érablières à sucre à bouleau jaune, les érablières à sucre à feuillus intolérants, les érablières à sucre à feuillus nobles et les érablières à sucre à hêtre. La dynamique naturelle de ces peuplements est principalement influencée par la formation de petites ouvertures créées par la mort d'arbres sénescents ou par de petits chablis causés par le vent.

Dans les ravages, ces strates représentent un potentiel de nourriture, de nourriture-abri ou peu utilisé. Ces peuplements sont très productifs en nourriture pour le cerf et ils présentent un potentiel de nourriture-abri lorsqu'on y trouve des îlots de résineux. Ces îlots peuvent avoir une valeur importante à l'échelle du ravage et leur récolte doit faire l'objet d'une bonne analyse. Les peuplements dominés par les feuillus tolérants présentent un risque d'envahissement par le hêtre ou des espèces concurrentes (érable à épis, cerisier de Pennsylvanie, etc.). L'aménagement de ces peuplements en structure irrégulière est favorisé et il doit également permettre de maintenir ou d'augmenter la proportion d'espèces longévives (bouleau jaune et érable à sucre). Ce regroupement est habituellement aménagé par des CP, selon une rotation de 20 à 30 ans.

4.2.5 Les feuillus tolérants à résineux

Le type de forêts regroupées des feuillus tolérants à résineux comprend les sapinières à bouleaux jaunes, les bétulaies jaunes à résineux et les érablières à sucre à résineux. Ce regroupement possède une dynamique naturelle complexe, influencée par le feu, les épidémies d'insectes (surtout par la TBE), le vent et la sénescence naturelle.

En matière d'habitat, ces peuplements représentent un potentiel d'abri, de nourriture-abri et de nourriture. Ces strates offrent des composantes abri et nourriture sur un même site. Il est de mise de conserver la composition mixte et de favoriser la structure inéquienne ou étagée de ces peuplements par des CP appropriées. Lorsque les peuplements sont dégradés, des CR peuvent être réalisées. L'entremêlement de l'abri et de la nourriture sera alors obtenu par une répartition dans le temps et sur l'ensemble du territoire de CR.

Le bouleau jaune croît régulièrement en association avec le sapin, dont la longévité est nettement inférieure à la sienne. La maturité et la proportion occupée par le sapin sont souvent les facteurs qui déterminent le choix entre la CP et la CR dans ces peuplements. La proportion de sapins varie beaucoup au sein d'une même strate mixte de bouleaux jaunes et de sapins. Pour ces raisons, la localisation des interventions doit faire l'objet d'une attention particulière lorsque ce type de peuplement se situe dans un ravage en déficit d'abri.

Ces forêts sont souvent envahies par des essences compétitrices. Dans le but de conserver la composition mixte et un potentiel d'abri intéressant, le reboisement à base d'épinette blanche sera priorisé sur 50 % de la superficie des sites mal régénérés.

4.2.6 Les bétulaies blanches, les bétulaies blanches à résineux, les peupleraies, les peupleraies à résineux et les érablières rouges

Les bétulaies blanches, les bétulaies blanches à résineux, les peupleraies, les peupleraies à résineux et les érablières rouges sont caractérisées par des peuplements ayant subi une perturbation grave (feu, épidémie d'insectes, chablis ou coupe totale). La perturbation subie a éliminé la plupart des arbres du peuplement et a engendré un processus de succession dominé par les essences pionnières. La majorité de ces peuplements possèdent une structure d'âge équienne.

Ces peuplements peuvent offrir un potentiel de nourriture-abri ou de nourriture ou encore être peu utilisés par les cerfs. Sur certains sites, les essences pionnières peuvent faire place aux résineux et représenter un potentiel d'abri à plus long terme. L'objectif général pour ces peuplements est de maintenir ou d'augmenter la proportion de résineux tout en favorisant les espèces longévives (épinette, thuya et pin). Généralement, ces peuplements forment une structure équienne et seront récoltés par CR. Dans les ravages présentant un problème de répartition de la nourriture (certains secteurs de Duchénier), il peut être pertinent d'étaler les récoltes dans le temps sur de petites superficies. La localisation et la superficie des CR doivent être établies en fonction de la maturité de la forêt et du développement de la régénération. Les peuplements de feuillus intolérants associés aux résineux comportent souvent une régénération résineuse bien développée. La protection de ce futur potentiel d'abri constitue une condition incontournable pour effectuer la récolte (voir la grille décisionnelle présentée à la section 5.2.4). Ces peuplements seront récoltés en priorité et feront l'objet de coupes avec protection de la haute régénération ou de coupes de succession.

5. Plan d'intervention 2025-2030


5.1 SUPERFICIE ET LOCALISATION DES SECTEURS D'INTERVENTION

Le tableau 5 présente la superficie des interventions de récolte à réaliser pour la période 2025-2030 dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès. Le plan comprend tous les secteurs de récolte où des interventions doivent être effectuées d'ici 2030. La figure 3 présente la localisation des secteurs d'intervention de récolte dans cette portion de ravage. Les inventaires requis et les prescriptions pour ces secteurs de récolte devront être effectués par le responsable de la gestion forestière de la FER de Macpès. Les traitements culturaux de remise en production après récolte (préparation de terrain et reboisement) de même que le dégagement et l'éducation des jeunes peuplements (EPC et nettoiement), ne sont pas présentés dans ce document. Ils devront être planifiés par le responsable de la gestion forestière de la FER de Macpès selon les mesures et les objectifs du plan de ravage.

Tableau 5 Superficie des interventions de récolte à effectuer pour la période 2025-2030 dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès

Superficie (ha) des interventions à effectuer pour la période 2025-2030	
Coupe de régénération (CR)	Coupe partielle (CP)
3	12

Figure 3. Localisation des secteurs d'intervention planifiés dans le ravinage
Ravinage Duchénier



Aire de confinement du cerf de Virginie

Habitat faunique du cerf de Virginie

Secteurs d'intervention planifiés

Coupe partielle (CP)

Coupe de régénération (CR)

Secteurs d'intervention reconduits

Coupe de régénération (CR)

Coupe partielle (CP)

Tenure

Publique

Privée

Forêt d'enseignement et de recherche

Unité d'aménagement

Limite d'unité de gestion forestière

Organisation administrative

Ville, localité

Municipalité régionale de comté (MRC)

Région administrative

Convention de gestion territoriale

Infrastructure de transport

Réseau principal

Réseau secondaire

Hydrographie

Cours d'eau

Plan d'eau

Projection cartographique

NAD 1983 MTM 6

Base de données régionale du MRNF

2025

Bas-Saint-Laurent (BDGEOF)

Production

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
Note : Le présent document n'a aucune portée légale.

© Gouvernement du Québec, 2025

Ressources naturelles
et Forêts

Québec

5.2 MODALITÉS PARTICULIÈRES D'INTERVENTION

Les interventions prévues dans le présent plan d'aménagement doivent être réalisées avant la fin de l'année d'activité 2029-2030. L'intervenant a le choix de réaliser les travaux sur une ou plusieurs années, mais il est recommandé de répartir les opérations dans le temps pour répondre aux besoins du cerf. Les interventions de récolte autres que les coupes de succession devraient être effectuées en hiver ou le plus tard possible en automne, puisque les rameaux des cimes d'arbres abattus constituent une source de nourriture importante pour les cerfs en cette période critique. La coupe de succession doit être effectuée en dehors de la période de gel pour protéger les tiges de haute régénération résineuse qui se brisent plus facilement lorsqu'elles sont gelées.

Les sous-sections suivantes présentent les mesures et les modalités d'intervention particulières à respecter dans les ravages de cerfs de Virginie. Lorsque les critères d'admissibilité ou les prescriptions pour réaliser les travaux diffèrent des normes exigées en forêt publique, ils sont décrits dans la sous-section suivante. Ces modalités pourront être retranscrites lors de l'élaboration des prescriptions sylvicoles.

5.2.1 Protection des essences longévives et des essences contribuant au maintien de la biodiversité

Thuya

Dans les ravages, **les peuplements forestiers dominés par le thuya sont exclus de toute récolte**. En plus de protéger les peuplements dominés par cette essence, il faut conserver le thuya intégralement lors de l'application de tous les types de traitement sylvicoles dans les autres peuplements. Lors des travaux d'éducation, le thuya doit être protégé et favorisé.

Pin blanc et pin rouge

Le pin blanc et le pin rouge font l'objet d'une attention particulière au Bas-Saint-Laurent. Ces espèces ont subi un recul important au cours du dernier siècle et, afin de s'assurer de protéger les derniers individus, la Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent a pris la décision d'interdire la récolte de ces deux espèces.

Chêne rouge, frêne blanc, frêne noir, orme d'Amérique, ostréier de Virginie et pruche d'Amérique

Ces essences sont situées à la limite de leur aire de distribution ou elles sont en voie d'être désignées menacées. Elles font l'objet d'une attention particulière dans la région et elles sont protégées intégralement lors des interventions. Leur observation doit être rapportée au Ministère selon la procédure établie (fiche de signalement du MRNF).

5.2.2 Lisières boisées riveraines

Aucune activité d'aménagement forestier n'est permise dans les 20 premiers mètres de la lisière boisée conservée en bordure d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage arbustif riverain, d'un lac ou d'un cours d'eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie.


5.2.3 Voirie forestière

Le développement du réseau de chemins multiusages contribue à réduire la superficie du couvert forestier à moyen et à long terme. La planification du réseau routier dans les aires de confinement du cerf de Virginie doit limiter la superficie occupée par ces infrastructures, donc minimiser les pertes et la fragmentation de l'habitat. Le déboisement maximal de l'emprise d'un chemin situé dans les limites d'une aire de confinement du cerf de Virginie est fixé à 20 m. Comme le mentionne la réglementation, la construction, l'amélioration ou la réfection d'un chemin sont interdites dans une aire de confinement du cerf de Virginie du 1^{er} décembre au 1^{er} mai.

5.2.4 Récolte dans les peuplements dominés par les peupliers

Le choix du type de récolte et les conditions d'admissibilité à la récolte dans les peuplements dominés par les peupliers sont décrits dans la grille décisionnelle présentée dans la figure 4.

Figure 4 Grille décisionnelle de récolte propre aux ravages situés dans les peuplements dominés par les peupliers



5.2.5 Coupe de régénération

Lors d'une CR, la superficie maximale d'un seul tenant est de 10 ha dans les peuplements résineux ou mélangés à prédominance de résineux, et de 25 ha dans les peuplements feuillus ou mélangés à prédominance de feuillus.

Lorsqu'un secteur de CR atteint la superficie maximale, un séparateur de coupe d'une largeur minimale de 60 m doit être conservé et maintenu en place entre deux aires de coupe totale jusqu'à ce que le couvert forestier dominant de ces aires de coupe ait atteint une hauteur moyenne de 7 m.

❖ Coupe avec protection de la régénération et des sols

Lorsque la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) est prescrite dans un peuplement dont :

- **le coefficient de distribution de la régénération en essences résineuses est supérieur à 60 % et**
- **les tiges de thuya de classe de diamètre à hauteur de poitrine (DHP) de 10 cm et plus occupent une surface terrière (ST) de 12 m² et plus,**

on doit protéger et laisser sur pied les tiges de pin gris, de sapin et d'épinette de la classe de 10, 12 et 14 cm de DHP et dont la cime vivante est égale ou supérieure à 40 % de la hauteur totale de l'arbre.

❖ Coupe avec réserve de semenciers

À la suite d'une coupe avec réserve de semenciers (CRS) réalisée sur un site dont le potentiel forestier est mixte avec bouleau jaune, l'objectif poursuivi est le retour d'un peuplement mixte avec 50 % de résineux. La récolte est habituellement suivie d'un reboisement en épinette blanche sur 50 % de la superficie et d'une préparation de terrain pour semer du bouleau jaune sur 50 % de la superficie.

❖ Coupe de succession

La coupe de succession (CS) consiste à récolter les arbres matures d'essences intolérantes à l'ombre qui forment l'étage supérieur d'un peuplement, tout en préservant la régénération en essences désirées établie en sous-étage (Majcen et coll., 2003). Elle vise donc à accélérer la succession naturelle d'un peuplement de structure bi-étagée.

La CS s'applique lorsque le coefficient de distribution en régénération d'essences désirées résineuses est suffisant en arbres d'avenir pour garantir le renouvellement du peuplement. Conserver les perchis (classes de 10 à 18 cm au DHP inclusivement) de sapins, d'épinettes et de pins gris ayant une hauteur inférieure ou égale à 10 m et dont la cime verte représente 40 % ou plus de la longueur.

Après traitement, la perte de densité relative (*stocking*) cumulée des gaulis de résineux et des perchis de résineux à conserver ne doit pas dépasser 40 % de leur densité relative avant traitement. Ce pourcentage inclut la superficie couverte par les sentiers.

5.2.6 Coupe partielle

Lorsque le thuya occupe la place d'essence compagne dans un peuplement traité en CP, un scarifiage partiel sera réalisé pour favoriser l'ensemencement.

Dans les cas de peuplements dominés par les peupliers et les feuillus intolérants qui comportent un sous-étage de résineux intéressant, la CP pourra être le traitement retenu en vue de préserver le potentiel d'abri de ces peuplements.

❖ Coupe progressive régulière

La coupe progressive régulière (CPR) est prescrite pour atteindre l'établissement ou la croissance de la régénération. Elle peut aussi être utilisée dans les ravages pour prolonger le potentiel d'abri d'un peuplement pour une minimale de 10 ans, indépendamment de l'état de la régénération. Lorsque le maintien du potentiel d'abri est le principal objectif poursuivi, le peuplement après coupe devra maintenir un couvert forestier de densité C.

❖ Coupe progressive irrégulière

La coupe progressive irrégulière (CPI) est un traitement sylvicole à favoriser dans les ravages. Les principaux objectifs poursuivis par l'aménagement des ravages peuvent être atteints par les CPI, principalement la CPI à couvert permanent.

Lorsque la CPI est prescrite dans un peuplement de structure inéquienne, comme c'est souvent le cas dans le ravage Duchénier, la CPI à couvert permanent en plein avec sélection par pied d'arbre ou groupe d'arbres sera favorisée.

5.2.7 Éclaircie précommerciale et nettoiement

Les mesures d'atténuation de la région du Bas-Saint-Laurent applicables à l'EPC et au nettoiement devront être respectées intégralement (MFFP, 2015). Lors de l'exécution de travaux d'EPC ou de nettoiement, toutes les tiges de sapin, d'épinette noire, d'épinette blanche, d'épinette rouge, de pin rouge et de pin gris dont la classe de DHP est supérieure à 8 cm doivent être conservées et considérées comme fantômes.

Les thuyas, les pins blancs et les bouleaux jaunes devront être conservés intégralement lors des travaux d'éducation (EPC et nettoiement).

5.2.8 Dégagement mécanique de la régénération

Seuls les peuplements issus de regarnis ou de plantations pourront être dégagés. Habituellement, un dégagement réalisé un an après le reboisement est suffisant pour assurer la croissance des plants. Comme le thuya échappe parfois à cette règle, il sera nécessaire d'évaluer la possibilité d'effectuer un deuxième dégagement dans les plantations de cèdres.

5.2.9 Regarni

Les essences à privilégier pour le reboisement dans les ravages de notre région sont le thuya³ et l'épinette blanche. Le regarni sans préparation de terrain doit être privilégié le plus tôt possible après la coupe. Les plants de forte dimension doivent être utilisés. Le regarni peut être effectué avec une seule essence.

Lorsque la densité de déchets de coupe est importante ou que la compétition est trop forte, on devra procéder à la préparation de terrain des parties mal régénérées.

5.2.10 Plantation

Les essences à privilégier pour le reboisement dans les ravages de notre région sont le thuya⁴ et l'épinette blanche.

Dans les sapinières à thuya, les pessières à thuya, les cédrères pures, les cédrères à feuillus, les cédrères à résineux, les cédrères à sapin et les cédrères à épinette, la plantation de thuya devra s'effectuer sur 50 % de la superficie. La plantation se fera alors en alternance : une rangée de thuyas, puis une rangée d'épinettes blanches, etc. La densité recherchée est de 1 600 plants/ha (gradient de base). Pour les autres types de forêts de résineux, la plantation de thuya devra s'effectuer sur 25 % de la superficie. Dans ces cas, un andain sur quatre sera reboisé complètement en thuya. La densité recherchée demeure la même, soit 1 600 plants/ha.

À la suite d'une CRS sur un site dont le potentiel forestier est mixte avec bouleau jaune, le reboisement en épinette blanche devra représenter 50 % de la superficie et la préparation de terrain pour y semer des feuillus devra être réalisée sur l'autre moitié (50 %) du site.

³ Le reboisement en thuya n'est pas recommandé dans les secteurs fortement occupés par les cerfs de Virginie. Pour le compartiment A du ravage Duchénier, dans sa portion située sur la FER de Macpès, cette situation ne s'applique pas et le thuya demeure une essence à privilégier lors du reboisement.

6. Conclusion

Dans ce compartiment, la proportion de peuplements offrant un potentiel d'abri a atteint l'objectif régional établi. Cependant, la proportion de nourriture-abris est en dessous du seuil minimal fixé. Le plan d'aménagement vise donc à augmenter à moyen terme le potentiel d'habitat en nourriture-abri et à favoriser l'entremèlement de ces deux composantes.

Le ravage Duchénier est occupé par les cerfs, mais la proportion du territoire fréquenté diminue dans le temps. Les observations montrent que les petits ravages sont en augmentation, ce qui semble refléter un état de fragmentation dans les réseaux de pistes et une diminution de la densité d'animaux dans le ravage. L'aménagement forestier dans ce ravage doit donc être le plus raffiné possible pour assurer la pérennité de l'espèce dans la région.

Les interventions prévues dans le plan d'aménagement doivent être réalisées avant la fin de l'année d'activité 2029-2030. Les travaux sont planifiés selon des mesures et des modalités d'intervention particulières. Les objectifs et les orientations utilisés tendent à répondre à des problèmes précis visant à la fois le maintien, l'amélioration et la restauration de l'habitat du cerf dans le compartiment A du ravage Duchénier situé sur la FER de Macpès.

7. Références

- BRASSARD, B., et C. LAROCQUE (1998). *Compte rendu d'une étude sur l'habitat du cerf dans le ravage Duchénier*, Société d'exploitation des ressources de La Neigette inc., Territoire populaire Chénier inc. et Ministère de l'Environnement et de la Faune, 33 p.
- GAGNON, L., G. ST-HILAIRE et M. RIOUX (2013). *Sommaire du plan d'aménagement forestier intégré tactique, Région du Bas-Saint-Laurent, UA 012-51*, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 240 p.
- HÉBERT, F., M. HÉNAULT, J. LAMOUREUX, M. BÉLANGER, M. VACHON et A. DUMONT (2013). *Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie*, 4^e édition, Ministère des Ressources naturelles et Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 62 p.
- MAJCEN, Z., S. BÉDARD et C. GODBOUT (2003). *Silvicultural Research in Québec's Hardwood Forest*, Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, communication présente au World Forestry Congress XII, 8 p.
- MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2015). *ANNEXE 2 – Mesures de mitigation applicables à l'éclaircie précommerciale et au nettoiement, Région du Bas-Saint-Laurent, exercices 2015-2018*, Direction générale du Bas-Saint-Laurent, 10 p.
- ROUSSEL-GARNEAU, É., et J. PHANEUF (2023). *Inventaire aérien de l'habitat du cerf de Virginie au Bas-Saint-Laurent – Hiver 2023*, Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 17p.

ANNEXE 1

Ajustement de la composante nourriture-abri du MQH-cerf
avec identification de l'abri en devenir

À l'aide des tables complémentaires des données du 5^e inventaire écoforestier du Québec méridional, l'identification de certains peuplements a été raffinée de manière à leur assigner une nouvelle classe d'utilisation potentielle par le cerf de Virginie. La figure suivante présente une adaptation de la classification habituellement utilisée (Hébert et autres, 2013) pour caractériser le potentiel d'utilisation des peuplements par le cerf. La composante abri en devenir a été ajoutée.

Classification utilisée au Bas-Saint-Laurent pour déterminer le potentiel d'utilisation par le cerf (adapté de Hébert et autres, 2013)

Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8		
Utilisation par le cerf	Type de peuplement	Densité		Hauteur		Classe d'âge			
		Stratification écoforestière initial	NAIPF	Stratification écoforestière initial	NAIPF				
Abri	Résineux, mixte (R)	A,B	65,75,85,95	1,2,3	≥ 12***	≥ 30 ans			
Abri_en_devenir	Résineux, mixte (R)	A,B	65,75,85,95	(4)**	7-12	≥ 30 ans			
	Résineux, mixte (R)	A,B	65,75,85,95	(5)**	≥ 4	≥ 10 ans (28 ans à 49 ans)			
Nourriture_Abri	Résineux, mixte (R)	C	45,55	1,2,3,4,(5)*	≥ 4	10 et plus (16 ans à 27 ans)			
	Mixte (F)	A,B,C	45,55,65,75,85,95	1,2,3,4,(5)*	≥ 4	10 et plus (16 ans à 27 ans)			
	Résineux, mixte	AB		(5)*	≥ 4	10 et plus (16 ans à 27 ans)			
Nourriture	Résineux, mixte	D	25,35	1,2,3,4,(5)****	≥ 4				
	Résineux, mixte	A,B,C,D,I,H	25,35,45,55,65,75,85,95	6,7	≤ 4				
	Feuillus	A,B,H		6,7	≤ 4				
	Feuillus	C,D,I		1,2,3,4,5,6,7	Toute hauteur				
	Résineux, mixte, feuillus					10			
	En régénération								
	Autres: emprise des lignes de transport d'énergie								
Peu utilisé	Feuillus	A,B	65,75,85,95	1,2,3,4,(5)*****	≥ 4	30 et plus			
	Mélaies								
	Improductifs								
	Jeunes plantations								
	Chablis total								
•	Strate qui passe de Nourriture à Nourriture-Abri								
**	Strate qui passe de Nourriture-Abri à Abri-Nourriture								
***	Strate de plus de ≥ 12 mètres considérée comme des peuplements exploitables et d'abri comme on en retrouvent en nature								

*****	Strates qui passe de Nourriture à peu utilisée								
Pour ce qui est de l'abri, le script actuel de l'IQH cerf intègre déjà des peuplements de cette classe d'âge soient les strates JIN et JIR ce qui correspond à notre objectif de départ, mais cet élément contribue à pousser cette catégorie d'habitat à la hausse (16%) de l'ensemble de l'abri. Superficie en abri 2251,8 ha et le total des superficies en habitat 4102,3 ha									

*Ressources naturelles
et Forêts*

Québec 